

Integrovaný test

NEJDOKONALEJŠÍ SCREENINGOVÁ STRATEGIE V PRŮBĚHU TĚHOTENSTVÍ



PREDIKO

PREDIKO, s.r.o.

Lešetín I 6966, 760 01 Zlín

tel.: +420 575 570 875
+420 606 780 317

www.prediko.cz



Vaše laboratoře

s.r.o.

Integrovaný test provádíme ve spolupráci
s laboratořemi Vaše laboratoře s.r.o.

Od začátku roku 2008 provádíme v naší laboratoři screening vrozených vývojových vad formou integrovaného testu. S výjimkou NIPT se jedná o nejdokonalejší klasickou screeningovou strategii vůbec, sestávají se z kombinovaného testu a triple testu.

Integrovaný test má nejvyšší senzitivitu, tzn., že s nejvyšší možnou pravděpodobností nemůžeme promeškat reálně přítomnou vadu plodu. Na druhé straně má test **nejnižší falešnou pozitivitu**, což znamená, že u tohoto testu je velmi malé procento falešně pozitivních výsledků, které by zbytečně těhotné ženy stresovaly. Velmi důležitým aspektem nízké falešné pozitivity je, že jen velmi malé procento žen se musí podrobovat diagnostickým invazivním výkonům (CVS, amniocentéza). Lepší screeningové parametry má pouze NIPT, které je založeno na detekci genetické výbavy plodu v krvi matky.

Náš screeningový protokol vychází ze zkušeností nerenomovanějších pracovišť tohoto typu ve Velké Británii (**Wolfson Institute Of Preventive Medicine, Londýn**, prof. Nicholas Wald), USA (**Brown University, Providence**). Na obou těchto pracovištích se naši pracovníci účastnili odborných stáží.

Vlastní organizace screeningu je založena na spolupráci dvou společností PREDIKO s.r.o. (www.prediko.cz) a Vaše laboratoře s.r.o. (www.vaselaboratore.cz) V centru prenatální diagnostiky PREDIKO s.r.o. se provádí ultrazvuková vyšetření a případně genetické konzultace. Biochemická vyšetření se provádějí v laboratořích Vaše laboratoře s.r.o. Laborator společnosti Vaše laboratoře je jedinou registrovanou laboratoří ze Zlína pro 1. i 2. trimestr těhotenství v Registru laboratoří provádějících screening VVV.


V případě, že přece jenom vyjde pozitivní výsledek screeningu, můžeme těhotné nabídnout provedení neinvazivního DNA testu (NIPT), nebo je provedeno invazivní vyšetření (CVS,AMC) na pracovišti PREDIKO s.r.o. a odebraný vzorek choriových klků nebo plodové vody je vyšetřen přímo ve Zlíně, v cytogenetické laboratoři Vaše laboratoře s.r.o. Výrazně se tím zkrátí doba čekání na výsledek v porovnání s minulostí, kdy byly tyto vzorky odesílány k analýze do Brna, Olomouce nebo jinam.

Žadné jiné pracoviště ve Zlínském kraji neposkytuje takto komplexní péči při sledování vývoje těhotenství a při managementu těhotné v případě komplikací z pohledu vrozených vývojových vad.

Integrovaný test

PRAKTIČKÝ POSTUP ABSOLVOVÁNÍ INTEGROVANÉHO TESTU

- **Zjištění těhotenství, návštěva gynekologa a určení délky těhotenství**
- **Telefonická objednávka** (bez nutnosti doporučení ošetřujícího lékaře) na první část integrovaného testu v 1. trimestru (kombinovaný test), (tel. 606 780 317). Toto objednání by optimálně mělo proběhnout v **10 až 13 týdnu těhotenství. V rámci tohoto testu budou provedena ultrazvuková a biochemická vyšetření.** UZ vyšetření se provádějí v Centru prenatální diagnostiky PREDIKO, s.r.o. (Lešetín I 6966, Zlín). Odběr krve je možno provést u nás, případně u ošetřujícího gynekologa, nebo v některé z odběrových místností laboratoři Vaše laboratoře s.r.o. Další případné dotazy budou zodpovězeny při tel. objednání.
- **Určení výsledku kombinovaného testu.** Pokud je negativní, tak těhotná pokračuje do 2. trimestru (viz níže) pro zajištění absolutně nejvyšší citlivosti a nejnižší falešné pozitivity. V případě pozitivního výsledku je ošetřujícím lékařem vysvětlen další možný postup a žena se sama rozhodne, jaký postup při sledování těhotenství dále zvolí (včetně možnosti provedení NIPT nebo včasné diagnostiky pomocí CVS).
- **Ošetřující gynekolog provede ve druhém trimestru** (optimálně 16-17 týden) **odběr na tzv. triple test**, který je součástí integrovaného testu. Odběr může být proveden v ordinaci ošetřujícího lékaře a krev si odvezete naše svozová služba nebo se pacientka dostaví přímo do našich odběrových místností se žádankou na triple test vyplňnou ošetřujícím gynekologem. **Ve 2. trimestru budou vyšetřeny další biochemické markery** včetně AFP, který je jediným markerem NTD (defektu neurální trubice). Defekt neurální trubice není možno v 1. trimestru testovat.
- **Vydání výsledku integrovaného testu** (vyhodnocení se provádí systémem ALPHA od britské společnosti Logical Medical System). Pokud bude výsledek negativní, tak těhotná absolvovala nejsenzitivnější test z hlediska vrozených vývojových vad. V případě pozitivního výsledku je opět další postup konzultován s ošetřujícím gynekologem, příp. lékařem Centra prenatální diagnostiky PREDIKO, s.r.o. (včetně možnosti provedení NIPT nebo amniocentézy).
- **Ve 20. týdnu je provedeno kontrolní UZ vyšetření.** Toto vyšetření se provádí na základě indikace ošetřujícího gynekologa. Na vyšetření je možno se objednat telefonicky na stejném čísle jako na kombinovaný test (606 780 317) a vyšetření je opět prováděno v Centru prenatální diagnostiky PREDIKO, s.r.o.



Integrovaný test =

kombinovaný test
(10 + 0 až 13 + 6)

+ screening ve druhém trimestru (triple test)
(14 + 0 až 22 + 0, ideální 15 + 0 až 17 + 0)

Týden těhotenství:

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----